



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
DÎMBOVIȚA

SERVICIUL CONTROL OFICIAL SANATATEA SI BUNASTAREA
ANIMALELOR

Nr. 22703 / 07 NOV. 2025

Catre,

Primaria.....

Avand in vedere urmatoarele aspecte esentiale:

In Romania, la data de 29.10.2025, a fost confirmat un caz de gripa aviara H5N1 la o lebada de vara, in judetul Constanta, ceea ce confirma prezenta virusului in mediul salbatic si necesitatea consolidarii masurilor de preventie.

La nivel european, in ultimele doua saptamani, au fost raportate focare de gripa aviara inalt patogena in 20 tari, afectand 53 exploataii de pasari domestice si 102 cazuri la pasarile salbatice.

In data de 15 si 17 octombrie 2025, Bulgaria a notificat doua focare de gripa aviara inalt patogena (H5N1) in regiunea Plovdiv, confirmate intr-o ferma de gaini outoare si una cu rate, cu aplicarea masurilor de sacrificare si restrictionare a miscarilor in zonele afectate.

In aceasta perioada are loc migratia de toamna a pasarilor salbatice, palmipede reprezentand rezervorul natural pentru virusul HPAI, ceea ce implica un risc crescut de raspandire a virusului pe teritoriul Romaniei.

In vederea reducerii riscului contactului intre pasarile domestice si salbatice se impune aplicarea urmatoarelor masuri:

- separarea in cadrul gospodariei, in masura posibilitatilor a ratelor si gastelor de alte pasari domestice pentru a limita transmiterea virusului gripei aviare.
- evitarea cresterii pasarilor domestice in aer liber, acestea fiind tinute in spatii de cazare special amenajate, inchise, iar atunci cand acest lucru nu este posibil, hranirea si adaparea pasarilor se va realiza intr-o zona acoperita la care nu pot avea acces pasarile salbatice.
- se interzice adaparea pasarilor domestice cu apa din rezervoarele de apa de suprafata accesibile pasarilor salbatice.
- se va evita intrarea mai multor persoane, in zona de exploatare a pasarilor domestice, miscarile limitandu-se la o singura persoana care are grija de animale.



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
DÎMBOVIȚA

-se va avea in vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozatoare si alte animale de compamie.

-se vor aplica masuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminarii unei eventuale infectii prin folosirea de incaltaminte diferita in spatiul de tinere/crestere a pasarilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfectia incaltamintei.

-prevenirea oricarui contact direct si indirect intre pasarile salbatice vii, in special cele de apa si pasarile salbatice domestice si alte pasari, in special ratele si gastele.

Astfel va trebui limitat pe cat posibil accesul tuturor pasarilor domestice si pasari salbatice captive la luciuri de apa, lacuri, balti, rauri si orice alta amenajare hidrologica artificiala sau naturala.

In acelasi timp, detectarea timpurie a virusului la pasarile salbatice este esentiala pentru evitarea contactului cu pasarile domestice si pentru a evalua riscul de raspandire in urma descoperirii acestuia la pasarile salbatice. **Aceste informatii vor fi comunicate proprietarilor de pasari prin intermediul relelelor de socializare, media, etc.**

In atasament va transmitem un pliant de informare ce trebuie afisat in spatiile publice.

Fata de cele relatate va rugam sa dispuneti masuri in consecinta.

De nerespectare ramaneti direct raspunzatori.

Dr. T. [redacted] iv,
Dr. T. [redacted] Marius

	Nume, Prenume	Funcție	Data	Semnatura
Avizat	Dr. Bucur Marius	Director Executiv Adjunct	07.11.2025	
Avizat	Dr. Cobianu Liviu	Sef SCOSBA	07.11.2025	
Elaborat	Dr. Sillo Razvan	SCOSBA	07.11.2025	

Gripă aviară (Influență aviară)

- boală virală extrem de contagioasă, care afectează în principal păsările, dar poate infecta și specii de mamifere-

Gripa aviară poate ucide efective întregi de păsări, cauzând pierderi devastatoare.

Factori care pot contribui la răspândirea virusului:

- păsările sălbatice și rutele de migrație;
- aglomerări de păsări sau piețele vii;
- comerțul necontrolat cu păsări vii;

Simptome clinice:

- decubit prelungit, stare letargică;
- inapetență, încetarea ouatului;
- respirație greoaie, tuse, febră;
- aripi zburlite, torticolis, paralizie;
- secreții din cioc și nări;
- creasta și bărbile umflate, de culoare roșu închis;



Crescătorii de păsări trebuie să respecte următoarele reguli:

- să anunțe medicul veterinar atunci când apar simptome de îmbolnăvire sau moarte la păsări sau animale;
- să își țină păsările închise în adăposturi pentru a reduce contactul cu alte păsări sălbatice;
- să limiteze accesul păsărilor domestice la lăcuiri de apă (bălți, lacuri, etc.);
- să acorde tot sprijinul medicilor veterinari și autorităților sanitar-veterinare și să respecte legislația în vigoare privind circulația și transportul păsărilor;
- să respecte normele de biosecuritate;

Gripă aviară (Influență aviară)

- boală virală extrem de contagioasă, care afectează în principal păsările, dar poate infecta și specii de mamifere-

Gripa aviară poate ucide efective întregi de păsări, cauzând pierderi devastatoare.

Factori care pot contribui la răspândirea virusului:

- păsările sălbatice și rutele de migrație;
- aglomerări de păsări sau piețele vii;
- comerțul necontrolat cu păsări vii;

Simptome clinice:

- decubit prelungit, stare letargică;
- inapetență, încetarea ouatului;
- respirație greoaie, tuse, febră;
- aripi zburlite, torticolis, paralizie;
- secreții din cioc și nări;
- creasta și bărbilele umflate, de culoare roșu închis;



Crescătorii de păsări trebuie să respecte următoarele reguli:

- să anunțe medicul veterinar atunci când apar simptome de îmbolnăvire sau moarte la păsări sau animale;
- să își țină păsările închise în adăposturi pentru a reduce contactul cu alte păsări sălbatice;
- să limiteze accesul păsărilor domestice la luciuri de apă (bălți, lacuri, etc.);
- să acorde tot sprijinul medicilor veterinari și autorităților sanitar-veterinare și să respecte legislația în vigoare privind circulația și transportul păsărilor;
- să respecte normele de biosecuritate;